



**SERVICE D'IMAGERIE DIAGNOSTIQUE
LAVEMENT BARYTÉ
(PATIENT EXTERNE)**

Votre médecin a demandé que vous subissiez une radiographie de votre gros intestin, que l'on appelle un lavement baryté. Cet examen permet de vérifier le gros intestin (côlon) pour y déceler des diverticules, des polypes et d'autres anomalies.

Un liquide, du sulfate de baryum, sera injecté dans votre gros intestin par le biais d'un petit tube inséré dans votre rectum. On vous demandera de vous tourner de gauche à droite, étendu sur la table de radiologie, alors que le liquide entre dans votre gros intestin. Après la prise de clichés, on vous demandera d'aller aux toilettes pour expulser le sulfate de baryum. On pourrait ensuite prendre un autre cliché avant que vous ne quittiez le Service d'imagerie diagnostique.

Vous devez complètement vider votre intestin avant l'examen. Votre collaboration est donc nécessaire, car vous devez suivre à la lettre les instructions préparatoires à l'examen. Attendez-vous à passer au moins une heure au Service d'imagerie diagnostique. On vous fournira une chemise d'hôpital.

Pour que l'examen soit réussi, vous devez coopérer pleinement pour vous y préparer, selon les instructions ci-dessous. Commencez à vous préparer à partir de MIDI (12 h), le jour avant votre examen. Il vous faut suivre les instructions à la lettre et ne prendre rien d'autre que les quantités de médicaments, de nourriture et d'eau indiquées, aux heures indiquées. Cochez chaque étape après l'avoir achevée. Attendez-vous à aller à la selle de nombreuses fois jusqu'à l'heure du coucher et peut-être pendant la nuit.

HEURE	INSTRUTIONS	✓ COCHEZ UNE FOIS ACHEVÉ
12 h (midi)	<u>DÎNER</u> <i>Ne mangez que ce qui suit :</i> - 1 ou 2 tasses de bouillon de soupe avec craquelins; - 1 sandwich à la viande blanche de poulet ou de dinde (sans beurre, mayonnaise, laitue ou autres additifs); - 1 verre de jus de pomme clair ou de jus de raisin clair; - 1 portion de Jell-O (sans crème, fruits ou autres additifs).	<input type="checkbox"/>
13 h	Buvez au moins un verre ou plus d'eau ou de jus clair.	<input type="checkbox"/>
15 h	Buvez au moins un verre ou plus d'eau ou de jus clair.	<input type="checkbox"/>

17 h **SOUPER** *Ne mangez que ce qui suit :*
- 1 ou 2 tasses de bouillon de soupe;
- 1 verre de jus de pomme clair ou de jus de raisin clair;
- 1 portion de Jell-O (sans crème, fruits ou autres additifs).

18 h 30 Buvez au moins un verre ou plus d'eau ou de jus clair.

19 h 30 Buvez une bouteille de 11 onces de citrate de magnésium (froid).

21 h 30 Prenez 2 comprimés de Bisacodyl avec au moins un verre ou plus d'eau. Les comprimés doivent être avalés entiers. Il ne faut pas les écraser ou les croquer. Ne prenez pas les comprimés dans l'heure qui suit ou précède la consommation d'antiacides ou de lait.

23 h Buvez au moins un verre ou plus d'eau ou de jus clair.

Le jour de l'examen :

Prenez un déjeuner de liquides clairs. Après l'examen, augmentez votre consommation de liquides pour le reste de la journée.

Présentez-vous au Service d'imagerie diagnostique à l'heure prévue.

Veuillez apporter cette feuille à votre examen.

Notez bien : Pour les bébés et enfants de 16 ans et moins, les instructions préparatoires sont laissées à la discrétion du médecin traitant.